

Bąblowica

- jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez larwy tasiemców (bąblowców) pasożytujących w jelicie zwierząt mięsożernych – głównie lisów, psów, kotów.

Człony tasiemca i jego jaja są przez zwierzęta wydalone na leśne runo i pozostają na jagodach, poziomkach, grzybach, trawie. Jaja tasiemca są odporne na warunki środowiskowe, w tym również na działanie niskich temperatur. W glebie zachowują zdolność do zakażenia nawet ponad rok.

Gdzie możemy się zarazić?

Zagrożenie bąblowicą występuje zarówno na terenie leśnym jak i w miastach. Człowiek zaraża się w wyniku przypadkowego spożycia jaj tasiemców, które znajdować się mogą w wodzie lub glebie zanieczyszczonej odchodami zakażonych zwierząt, a także na owocach leśnych (jagodach, poziomkach, malinach itp.) i grzybach. Do zakażenia może też dojść poprzez bezpośredni kontakt z lisami i psami. Jaja tasiemca znajdować się mogą na sierści, pysku i języku zakażonych zwierząt oraz na zanieczyszczonych odchodami przedmiotach.

Uniknąć zakażenia można poprzez dokładne mycie jagód i innych owoców leśnych przed jedzeniem oraz przestrzeganie zasad higieny osobistej - mycie rąk przed jedzeniem i przygotowywaniem posiłków, a także po kontakcie ze zwierzętami.